

LE LESIONI CUTANEE SECONDARIE

Le lesioni cutanee secondarie rappresentano l'evoluzione delle lesioni primarie che sono già in atto.

Esse sono rappresentate :

SQUAMA

La squama è formata da un ammasso di cellule dello strato più superficiale dell'epidermide che sono pronte per essere eliminate. La squama è il risultato di un ammassamento di cellule morte che si sfaldano e che spesso lasciano sotto di sé uno strato eritematoso irritato tipico della psoriasi o della forfora.

CROSTA

La crosta ha un contenuto ematico (sangue) nel suo interno che la rende di colore scuro e rugoso . E' la conseguenza di una lesione cutanea e del suo processo di riparazione, per il quale non andrebbe tolta troppo velocemente.

RAGADE

La ragade è un taglio della cute più o meno doloroso a seconda della sua profondità. Le zone più colpite possono essere le mucose e anche regioni palmo plantari (mani e piedi) e il capezzolo. Sempre a seguito di una ragade è interessato un fenomeno infiammatorio.

EROSIONE

L'erosione è la perdita di tessuto epidermico per via dell'erosione dovuta a contusioni (escoriazione) o apertura di una vescicola (ulcerazione). La caratteristica dell'erosione è di fare siero e in un secondo momento si può formare la crosta.

ULCERAZIONE

Ferita profonda oltre il derma che spesso guarendo lascia una cicatrice. E' una lesione che se non viene curata bene può generare delle infezioni nella pelle molto gravi.

CICATRICE

La cicatrice è il processo che consegue alla formazione di lesioni primarie o secondarie di natura traumatica. E' data dalla formazione di nuovo tessuto connettivo che inizialmente può essere in rilievo e di colore rosaceo, dopo dovrebbe uniformarsi e rimanere leggermente più chiaro della pelle e un po' incavato. Se il processo di guarigione non è corretto al posto della cicatrice si può formare un cheloide che è un inspessimento della cicatrice che non è doloroso ma sicuramente antiestetico da vedere.

ATROFIA

L'atrofia è una zona della pelle che si assottiglia e in cui si ha perdita di elasticità e di colore. Questo fenomeno è meglio conosciuto come smagliatura e spesso si verifica negli individui di sesso femminile a seguito di stiramenti della pelle dati soprattutto dall'aumento di peso o dimagrimenti troppo eccessivi.

L'ALBINISMO

L'albinismo rientra nelle lesioni cutanee primarie ed è causato da una perdita di produzione di melanina . La conseguenza è la scarsa o nulla pigmentazione cutanea di pelle, occhi e capelli. L'albinismo è una anomalia congenita ed ereditaria che spesso causa gravi problemi visivi.

Possiamo avere diversi tipi di albinismo :

- Oculo –cutaneo con mancanza di pigmento in tutto il corpo.
- Albinismo parziale con mancanza di melanina solo in alcune zone
- Albinismo oculare, manca nella retina il pigmento melanico con problematiche alla vista medio-gravi.